

ການປິ່ນປົວ ພະຍາດ-19 ຄໍາແນະນໍາໄວ

ປະເພດຂອງ ປິ່ນປົວພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ມີ	ການສໍາພັດກ່ອນໜ້ານີ້ ການປ້ອງກັນ	ໂມໂນໂຄລນ (Monoclonal) ພູມຕ້ານທານ	ຢາຕ້ານໄວຣັດກົນ ຈາກປາກ	ຢາຕ້ານໄວຣັດ IV
ອັນໃດມີ	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
ສໍາລັບໃຜ?	<p>ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະເດັກນ້ອຍຄົນເຈັບ (ຢ່າງໜ້ອຍ 12 ປີ ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນນໍ້າໜັກ ຢ່າງໜ້ອຍ 40 kg) ຜູ້ທີ່:</p> <ul style="list-style-type: none"> ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕິດເຊື້ອ SARS-CoV-2 (ໂຄວິດ-19). ບໍ່ດົນມານີ້ຮູ້ວ່າບໍ່ໄດ້ສໍາພັດກັບ ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດ SARS CoV-2 (ໂຄວິດ-19). ມີພູມຄຸ້ມກັນບົກຜ່ອງ ປານກາງຫາ ຮ້າຍແຮງ. ບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 	<p>ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະເດັກນ້ອຍ ຄົນເຈັບ (ຢ່າງໜ້ອຍ ອາຍຸ 12 ປີ ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນ ນໍ້າໜັກ ຢ່າງໜ້ອຍ 40 kg) ຜູ້ທີ່:</p> <ul style="list-style-type: none"> ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ມີ ອາການຮ້າຍແຮງຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ລວມທັງ ການເຂົ້າອອນໂຮງໝໍ ຫຼື ເສຍຊີວິດ. 	<p>Paxlovid:</p> <ul style="list-style-type: none"> ໃຫຍ່ ແລະເດັກນ້ອຍ ຄົນເຈັບ (ຢ່າງໜ້ອຍ 12 ປີ ແລະສູງກວ່ານັ້ນນໍ້າໜັກ ຢ່າງໜ້ອຍ 40 kg). <p>Lagevrio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ມີອາການຮ້າຍແຮງຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ລວມທັງ ການເຂົ້າອອນໂຮງໝໍ ຫຼື ເສຍຊີວິດ. ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ແນະນໍາ ເປັນຢ່າງອື່ນໃນການປິ່ນປົວ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ການ ປິ່ນປົວພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ອື່ນໆຫຼື ບໍ່ 	<p>ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະເດັກນ້ອຍ ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 12 ປີ ແລະ ສູງກວ່ານັ້ນ ນໍ້າໜັກຢ່າງໜ້ອຍ 40 kg) ຜູ້ທີ່:</p> <ul style="list-style-type: none"> ເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ແລະມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ມີອາການຮ້າຍແຮງຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ລວມທັງ ການເຂົ້າອອນໂຮງໝໍ ຫຼື ເສຍຊີວິດ. <p>ຄົນເຈັບທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍ ນໍ້າໜັກ 3.5 kg ໄປຫາ ໜ້ອຍກວ່າ 40 kg ຫຼື ຄົນເຈັບທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍອາຍຸໜ້ອຍ ກວ່າ 12 ປີ ນໍ້າໜັກຢ່າງໜ້ອຍ 3.5 kg ຜູ້ທີ່:</p> <ul style="list-style-type: none"> ເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າປິ່ນປົວໃນໂຮງໝໍແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ມີ ອາການຮ້າຍແຮງຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ລວມທັງການເຂົ້າອອນ ໂຮງໝໍ ຫຼືເສຍຊີວິດ.
ໄປໃຊ້ໄດ້ເມື່ອໃດ?	2 ອາທິດພາຍຫຼັງສັກຢາວັກຊີນ	ພາຍໃນ 7 ວັນ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນຫຼັງຈາກການ ກວດ ເປັນຜົນບວກ ສໍາລັບ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19	ໃນ 5 ມື້ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນຫຼັງຈາກການກວດ ເປັນຜົນບວກ ສໍາລັບ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19	ພາຍໃນ 7 ວັນ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່ານັ້ນຫຼັງຈາກການກວດ ເປັນຜົນບວກ ສໍາລັບ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19
ໄປໃຊ້ແນວໃດ?	ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ	ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ	ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລ ສຸຂະພາບ, ຮ້ານ ຂາຍຢາໃນທ້ອງຖິ່ນ	ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລຄົນເຈັບພາຍໃນ ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ

ສາມາດຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ [hhs.gov](https://www.hhs.gov)



DOH 825-035 May 2022 Lao

ເພື່ອຂໍເອກະສານນີ້ໃນຮູບແບບອື່ນ, ໃຫ້ໂທ 1-800-525-0127. ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຫຼຸດໜວກ ຫຼື ມີບົກພ່ອງການໄດ້ຍິນ,
ກະລຸນາໂທ 711 (Washington Relay) ຫຼື ສົ່ງອີເມວໄປທີ່ civil.rights@doh.wa.gov.