கோவிட்-19 க்கான சிகிச்சைகள்
விரைவு வழிகாட்டி

கோவிட்-19 க்கான சிகிச்சை வகைகள்	முன்-வெளிப்பாடு நோய்த்தடுப்பு	மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிகள்	வாய்வழி ஆன்டிவைரல்கள்	IV ஆன்டிவைரல்கள்
என்னென்ன சிகிச்சைகள் உள்ளன	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
இது யாருக்காக?	பின்வரும் மருத்துவ நிலைகளில் உள்ள பெரியவர்கள் மற்றும் குழந்தை நோயாளிகள் (12 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட குறைந்தது 40 கிலோ எடை கொண்டவர்கள்): • தற்போது SARS-CoV-2 (கோவிட்-19) வைரஸால் பாதிக்கப்படாதவர்கள். • SARS-CoV-2 (கோவிட்-19) ஆல் பாதிப்படைந்த ஒருவருடன் சமீபத்திய தெரிந்த வெளிப்பாடு இல்லாதவர்கள். • மிதமான மற்றும் கடுமையான நோயெதிர்ப்புக் குறைபாடு கொண்டவர்கள். • கோவிட்-19 தடுப்பூசியை செலுத்திக்கொள்ள பரிந்துரைக்கப்படாதவர்கள்.	பின்வரும் மருத்துவ நிலைகளில் உள்ள நோயாளிகள் (குறைந்தது 12 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள் குறைந்தது 40 கிலோ எடை கொண்டவர்கள்): • மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுதல் அல்லது இறப்பு உட்பட கடுமையான கோவிட்-19 க்கு தீவிரமடையும் அதிக ஆபத்தில் உள்ளவர்கள்.	**Paxlovid:** • பெரியவர்கள் மற்றும் குழந்தை நோயாளிகள் (12 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்கள் குறைந்தது 40 கிலோ எடையுள்ளவர்கள்). **Lagevrio:** • மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுதல் அல்லது இறப்பு உட்பட கடுமையான கோவிட்-19 க்கு தீவிரமடையும் அதிக ஆபத்தில் உள்ளவர்கள். • மாற்று கோவிட்-19 சிகிச்சை விருப்பங்கள் பரிந்துரைக்கப்படாத அல்லது பிற கோவிட்-19 சிகிச்சை விருப்பங்களை அணுக முடியாத பெரிய வயதுடையவர்கள்.	பின்வரும் மருத்துவ நிலையில் உள்ள பெரியவர்கள் மற்றும் குழந்தை நோயாளிகள் (12 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட குறைந்தது 40 கிலோ எடையுள்ளவர்கள்): • மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுபவர்கள் • மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படாதவர்கள் மற்றும் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுதல் அல்லது இறப்பு உட்பட கடுமையான கோவிட்-19 க்கு தீவிரமடையும் ஆபத்தில் உள்ளவர்கள். பின்வரும் மருத்துவ நிலையில் உள்ள 3.5 கிலோவிலிருந்து 40 கிலோவை விட குறைவான எடையுள்ள அல்லது 12 வயதுக்கும் குறைவான குறைந்தது 3.5 எடையுள்ள குழந்தை நோயாளிகள்: • மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுபவர்கள் • மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படாதவர்கள் மற்றும் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுதல் அல்லது இறப்பு உட்பட கடுமையான கோவிட்-19 க்கு தீவிரமடையும் ஆபத்தில் உள்ளவர்கள்.
எப்போது அணுக வேண்டும்?	தடுப்பூசி செலுத்திய 2 வாரங்களுக்குப் பிறகு	7 நாட்கள் அல்லது அதற்கும் குறைவான நாட்களுக்குள் நேர்மறை கோவிட்-19 பரிசோதனை முடிவு	5 நாட்கள் அல்லது அதற்கும் குறைவான நாட்களுக்குள் நேர்மறை கோவிட்-19 பரிசோதனை முடிவு	7 நாட்கள் அல்லது அதற்கும் குறைவான நாட்களுக்குள் நேர்மறை கோவிட்-19 பரிசோதனை முடிவு
எவ்வாறு அணுக வேண்டும்?	சுகாதார வழங்குநர்கள்	சுகாதார வழங்குநர்கள்	சுகாதாரப் பராமரிப்பு வழங்குநர்கள், உள்ளூர் மருந்தகங்கள்	உள்நோயாளிகளுக்கான சுகாதார வசதிகள்

மேலும் அதிக தகவல்களை hhs.gov இல் காணலாம்

Washington State Department of Health

DOH 825-035 May 2022 Tamil

இந்த ஆவணத்தை வேறொரு வடிவத்தில் கோருவதற்கு, 1-800-525-0127 ஐ அழைக்கவும். காது கேளாத அல்லது காது குறைபாடுடைய வாடிக்கையாளர்கள், தயவுசெய்து 711 (Washington Relay) என்ற எண்ணில் அழைக்கவும் அல்லது civil.rights@doh.wa.gov க்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும்.