

የ COVID-19 የቴራፒ ሕክምናዎች

ፈጣን መመሪያ

የ COVID-19 የቴራፒ ሕክምና ዓይነት	ከተጋላጭነት በፊት ፕሮፊሊሲስ	ሞኖክሎናል አንቲቦዲዎች	በአፍ የሚወሰዱ ጸረ-ቫይረስ መድኃኒቶች	በአይቪ የሚወሰዱ ጸረ-ቫይረስ መድኃኒቶች
ምን ይገኛል?	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio: (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
ለማን ነው?	አዋቂ እና የሕፃናት ሕክምና ታካሚዎች (ቢያንስ 12 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆናቸው ቢያንስ 40 ኪ.ግ የሚመዘኑ) ማን:- <ul style="list-style-type: none"> • በአሁኑ ሰዓት በ SARS-CoV-2 (COVID-19) ያልተያዙ። • የሚታወቅ የቅርብ ጊዜ ተጋላጭነት በ SARS CoV-2 COVID-19 ከተያዘ ሰው ጋር አልነበረም። • በመጠኑ እስከ በከባዱ የበሽታ መከላከያ አቅማቸው የተዳከመ። • የሚመከር አይደለም የ COVID-19 ክትባት። 	አዋቂ እና የሕፃናት ሕክምና ታካሚዎች (ቢያንስ 12 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆናቸው ሰዎች ቢያንስ 40 ኪ.ግ የሚመዘኑ) ማን:- <ul style="list-style-type: none"> • ከፍተኛ ስጋት አለባቸው ወደ ከባድ የ COVID-19 በሽታ ሆስፒታል መተኛትን ወይም ሞትን ጨምሮ። 	Paxlovid: <ul style="list-style-type: none"> • አዋቂ እና የሕፃናት ሕክምና ታካሚዎች (12 ዓመት እና ከዚያ በላይ የሆናቸው ሰዎች ቢያንስ 40 ኪ.ግ የሚመዘኑ)። Lagevrio: <ul style="list-style-type: none"> • አዋቂዎች ከፍተኛ ስጋት ወደ ከባድ የ COVID-19 በሽታ ሆስፒታል መተኛትን ወይም ሞትን ጨምሮ። • አማራጭ COVID-19 ሕክምና ምርጫዎች የማይመከሩ አዋቂዎች ወይም ለሌላ የ COVID-19 ሕክምና ተደራሽነት የሌላቸው። 	አዋቂዎች እና የሕፃናት ሕክምና ታካሚዎች (12 ዓመት እድሜ እና ከዚያ በላይ ቢያንስ 40 ኪ.ግ የሚመዘኑ) ማን:- <ul style="list-style-type: none"> • በሆስፒታል የተኙ • ሆስፒታል ያልተኙ እና በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ የሆኑ ወደ ከባድ የ COVID-19 በሽታ፣ ሆስፒታል መተኛትን ወይም ሞትን ጨምሮ። ሕፃናት ታካሚዎች ከ 3.5 ኪ.ግ እስከ 40 ኪ.ግ በታች የሚመዘኑ ሕፃናት ታካሚዎች ከ 12 ዓመት እድሜ በታች ቢያንስ 3.5 ኪ.ግ የሚመዘኑ ማን:- <ul style="list-style-type: none"> • በሆስፒታል የተኙ • ሆስፒታል ያልተኙ እና በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ የሆኑ ወደ ከባድ የ COVID-19 በሽታ፣ ሆስፒታል መተኛትን ወይም ሞትን ጨምሮ።
መቼ ይገኛል?	ከክትባት 2 ሳምንታት በኋላ	በ 7 ወይም ከዚያ ባነሱ ቀናት አዎንታዊ የምርመራ ውጤት ካገኙ በኋላ ለ COVID-19	በ 5 ወይም ከዚያ ባነሱ ቀናት አዎንታዊ የምርመራ ውጤት ካገኙ በኋላ ለ COVID-19	በ 7 ወይም ከዚያ ባነሱ ቀናት አዎንታዊ የምርመራ ውጤት ካገኙ በኋላ ለ COVID-19
እንዴት ይገኛል?	የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች	የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች	የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች፣ አካባቢያዊ መድኃኒት ቤቶች	የታካሚ ህክምና ተቋማት

የበለጠ መረጃ በ hhs.gov መገኘት ይችላል

