

TRAITEMENTS COVID-19

PETIT GUIDE

| Type de traitements COVID-19 | Prophylaxie Pré-Exposition | Anticorps monoclonaux | Antiviraux Oraux | Antiviraux IV |
|------------------------------|---|--|---|--|
| Ce qui existe | Evusheld | Bebtelovimab | Lagevrio (molnupiravir) Paxlovid | VEKLURY (remdesivir) |
| Pour qui ? | <p>Adulte et enfant (d'au moins 12 ans et plus pesant au moins 40 kg) qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ne sont pas actuellement infectés par le SRAS-CoV-2 (COVID-19). n'ont pas eu de contact récent avec une personne infectée par le SRAS-CoV-2 (COVID-19). sont modérément à sévèrement immunodéprimés. à qui il n'est pas recommandé de recevoir le Vaccin contre la COVID-19. | <p>Adultes et enfants (d'au moins 12 ans et plus pesant au moins 40 kg) qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> ont un risque élevé d'évoluer vers un état grave de la COVID-19, dont une hospitalisation ou un décès. | <p>Paxlovid :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adultes et enfants (d'au moins 12 ans et plus pesant au moins 40 kg). <p>Lagevrio :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adultes ayant un risque élevé d'évoluer vers un état grave de la COVID-19, dont une hospitalisation ou un décès. Adultes qui n'ont pas de traitement alternatif à la COVID-19 recommandé ou qui n'ont pas accès à d'autres traitements de la COVID-19. | <p>Adultes et enfants (d'au moins 12 ans et plus pesant au moins 40 kg) qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> sont hospitalisés ne sont pas hospitalisés et qui ont un risque élevé d'évoluer vers un état grave de la COVID-19, dont une hospitalisation ou un décès. <p>Les enfants pesant entre 3,5 kg et 40 kg ou les enfants âgés de moins de 12 ans et pesant au moins 3.5 kg qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> sont hospitalisés ne sont pas hospitalisés et qui ont un risque élevé d'évoluer vers un état grave de la COVID-19, dont une hospitalisation ou un décès. |
| Quand y avoir droit? | 2 semaines après la vaccination | Dans les 7 jours ou moins après avoir été testé positif à la COVID-19 | Dans les 5 jours ou moins après avoir été testé positif à la COVID-19 | Dans les 7 jours ou moins après avoir été testé positif à la COVID-19 |
| Où y accéder ? | Chez les prestataires de soins de santé | Chez les prestataires de soins de santé | Chez les prestataires de soins de santé, les pharmacies locales | Dans les établissements de soins de santé pour les personnes hospitalisées |

Vous pouvez trouver plus d'informations sur [hhs.gov](https://www.hhs.gov)



DOH 825-035 May 2022 French

Pour demander ce document dans un autre format, appelez le 1-800-525-0127. Clients sourds ou malentendants, veuillez appeler le 711 (Washington Relay) ou email civil.rights@doh.wa.gov.