

¡Manténgase sano!

Cuide su salud y la de sus aves

La **psitacosis** (fiebre del loro u ornitosis) es una infección causada por la bacteria *Chlamydia psittaci* que algunas aves pueden transmitir a los humanos. En las aves, esta infección se denomina **clamidiosis aviar**.



Son varios los tipos de aves que pueden contagiar la psitacosis, pero es más frecuente en aves psitácidas (del tipo de los loros), sobre todo en cacatúas y periquitos (también llamados cotorras o papagayos).

Cómo prevenir la psitacosis y la clamidiosis aviar:

- Lávese las manos antes y después de tocar sus aves. La secreción nasal y los excrementos de las aves que tienen la infección pueden enfermarlo.
- Mantenga limpios los entornos y las jaulas de sus aves.
- Aísle a las aves que ha adquirido recientemente de las demás durante 30 días y obsérvelas para detectar si están enfermas.
- Evite la superpoblación de aves.
- Coloque las jaulas de manera que la comida, las plumas y los excrementos no puedan esparcirse entre ellas. No apile las jaulas. Si las jaulas están una junto a otra, asegúrese de que tengan paredes sólidas o barreras.

Preste atención a los siguientes síntomas:

Aves:

- Secreción nasal
- Estornudos
- Tos
- Plumaje revuelto
- Decaimiento
- Diarrea

Humanos:

- Escalofríos
- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Tos
- Dolores musculares

Es posible que las aves que tienen la infección parezcan sanas y no muestren síntomas, pero aun así pueden propagar la enfermedad en los humanos y otras aves.

Si nota alguno de estos síntomas, consulte con un veterinario o un proveedor de atención médica.

