

COVID-19 ကုထုံးများ အမြန်လမ်းညွှန်

COVID-19 ကုထုံးများ ပုံစံ	ကြိုတင်ကာကွယ် သည့်ဆေးများ	မိနိုကလိုနယ်ပ င်ပစ္စည်း	သောက်ဆေး များ	IV သွင်းဆေး များ
ဘာတွေ ရှိသလဲ။	Evusheld	Bebtelovimab	Lagevrio: (molnupiravir) Paxlovid	VEKLURY (remdesivir)
ဘယ်သူအတွက် လဲ။	လူကြီးနှင့် ဆေးဝါး စောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်သော လူနာများ(အနည်းဆုံးအသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် ကိုယ် အလေးချိန် အနည်းဆုံး 40 ကီလိုဂရမ်) တို့တွင် - <ul style="list-style-type: none"> • လောလောဆယ် ရောဂါကူးစက် မခံရသူ SARS-CoV-2 (COVID-19). • မကြာသေးမီက ရောဂါကူးစက်ခံရသူနှင့် ထိတွေ့မှု မရှိသေးသူ SARS CoV-2 (COVID-19) ရောဂါ • အတော်အသင့် မှ ပြင်းထန်စွာ ရောဂါကူး စက်နိုင်ခြေရှိသူများ • Covid19 ကာကွယ်ဆေး လက်ခံထိုးရန် တိုက်တွန်း ခံရခြင်းမရှိသူများ 	လူကြီးနှင့် ဆေးဝါး စောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်သောလူနာများ (အနည်းဆုံး အသက် ၁၂ နှစ် နှင့် အထက် ကိုယ်အလေးချိန် အနည်းဆုံး 40 ကီလိုဂရမ်) တို့တွင် - <ul style="list-style-type: none"> • COVID-19 ရောဂါ ကို ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားနိုင်သည့် အန္တရာယ် ရှိ သူများ ဖြစ် နိုင်သည်မှာ ဆေးရုံတက် ခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးနိုင်သည့် အထိ 	Paxlovid: <ul style="list-style-type: none"> • လူကြီးနှင့် ဆေးဝါး စောင့်ရှောက်မှု လိုအပ် သော လူနာများ (အနည်းဆုံး အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် နှင့် ကိုယ်အလေးချိန် အနည်းဆုံး 40 ကီလိုဂရမ်) Lagevrio: <ul style="list-style-type: none"> • COVID-19 ရောဂါ ကို ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားနိုင် သည့် အန္တရာယ် ရှိ သူများ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ ဆေးရုံတက်ခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးနိုင် သည့်အထိ • Covid19 ကာကွယ်ဆေး လက်ခံ ထိုးရန် တိုက်တွန်းခံ ရခြင်း မရှိသော လူကြီး များ သို့မဟုတ် အခြား သော COVID-19 ကု သမှုများအား ရရှိခွင့် မ ရှိသူများ 	လူကြီးနှင့် ဆေးဝါး စောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်သော လူနာများ(အနည်းဆုံး အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် နှင့် အနည်းဆုံးကိုယ်အလေးချိန် 40 ကီလိုဂရမ်) တို့တွင် - <ul style="list-style-type: none"> • ဆေးရုံတင်ထားရသူများ • COVID-19 ရောဂါ ကို ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားနိုင် သည့် အန္တရာယ် ရှိ သူများ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ ဆေးရုံတက်ခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးနိုင်သည့် အထိ ကိုယ်အလေးချိန် 3.5 ကီလိုဂရမ်မှ 40 ကီလိုဂရမ် အောက် သို့မဟုတ် ဆေးဝါး စောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်သော လူနာများ အသက် ၁၂ နှစ် အောက် ကိုယ်အလေးချိန် အနည်းဆုံး 3.5 ကီလိုဂရမ် ရှိ သော ဆေးဝါးစောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်သော လူနာများ တို့တွင် - <ul style="list-style-type: none"> • ဆေးရုံတင်ထားရသူများ • COVID-19 ရောဂါ ကို ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်ပွားနိုင် သည့် အန္တရာယ် ရှိ သူများ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ ဆေးရုံတက်ခြင်း သို့မဟုတ် သေဆုံးနိုင် သည့်အထိ
ဘယ်အချိန်မှာ ရနိုင်သလဲ။	ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး 2 ပတ်	COVID-19 ရောဂါပိုး စမ်းသပ်တွေ့ရှိပြီး 7 ရက် အတွင်း သို့မဟုတ် ၎င်းထက် နည်းသောအချိန်အတွင်း	COVID-19 စမ်းသပ်တွေ့ရှိပြီး 5 ရက်အတွင်း သို့မဟုတ် ၎င်း ထက်နည်းသောအချိန်အတွင်း	COVID-19 ရောဂါပိုး စမ်းသပ် တွေ့ရှိပြီး 7 ရက်အတွင်း သို့မဟုတ် ၎င်းထက်နည်းသော အချိန်အတွင်း
ဘယ်လိုရနိုင် သလဲ။	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပံ့ပိုးသူများ	ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပံ့ပိုး သူများ	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပံ့ပိုးသူများ၊ နယ်မြေဒေသ တွင်းရှိ ဆေးဆိုင်များ	အတွင်းလူနာကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများ

နောက်ထပ် အချက်အလက်များကို hhs.gov တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။

