



Comunicado de Prensa

Para publicación inmediata: Junio 3, 2016

(16-064-Spanish)

Contactos: [Julie Graham](#), Oficina de Comunicaciones 360-810-1628
[Sharon Moysiuk](#), Oficina de Comunicaciones 360-549-6471

Mosquitos con el Virus del Nilo Occidental Detectados en el Condado de Yakima

Oficiales de la salud urgen a tomar medidas de prevención para prevenir picaduras de mosquito.

OLYMPIA – Exámenes han detectado el virus del Nilo Occidental en mosquitos en el condado de Yakima por primera vez este año. Oficiales de la salud del Departamento de Salud están aconsejando al público a tomar acciones para no ser picados por mosquitos y reducir las áreas donde los mosquitos puedan criarse.

Durante la temporada de mosquitos de año pasado, 24 personas se enfermaron con el virus del Nilo Occidental en el estado de Washington y una persona murió a resultado de la infección. La temporada del año pasado presento el mayor número de casos reportados desde el 2009. La mayoría de las personas infectadas con el virus del Nilo Occidental no se enferman. Alrededor de una en cada cinco personas desarrollan fiebre u otros síntomas que se disipan sin tratamiento médico. Sin embargo, para un número pequeño de personas, la enfermedad puede ser muy seria y causar efectos neurológicos permanentes o muerte. Personas de 60 años o más tienen más riesgo de enfermedad severa; también personas con ciertas condiciones médicas, como el cáncer, diabetes, hipertensión y enfermedades renales.

Por más de una década, el Departamento de Salud y de Agricultura del estado de Washington, agencias locales de salud, y los distritos de control de mosquitos han estado examinando mosquitos, aves, caballos y personas para saber cómo el virus del [Nilo Occidental se propaga en nuestro estado](#). Estas pruebas a largo plazo demuestran que el virus probablemente se quede en el área centro sur de Washington.

La actividad del virus del Nilo Occidental varía de temporada en temporada, pero las acciones simples que pueda tomar para protegerse de las picaduras de mosquito e infecciones son las mismas.

La mejor manera de prevenir la infección del virus del Nilo Occidental es reduciendo los hábitat de mosquitos y previniendo sus picaduras.

Prevenga picaduras:

- Use un repelente de mosquitos efectivo y [registrado por le EPA](#).
- Cúbrase. Cuando el tiempo favorezca, use camisa de manga larga, pantalón largo, y medias cuando este al aire libre.
- Evite los mosquitos. Muchos mosquitos, como los aquellos que cargan el virus del Nilo Occidental, pican entre el amanecer y el anochecer. Asegúrese de usar un repelente y ropa que cubra la piel.

Reduzca el número de mosquitos alrededor de su casa, vaciando agua estancada de los floreros, baldes, latas, tiestos, cubiertas de piscinas, platos de mascotas, llantas, canaletas y tanques para aves, regularmente.

A pesar de que el virus del Nilo Occidental ocurre en todo los Estados Unidos, otras enfermedades causadas por mosquitos como el dengue, chikungunya, y el Zika son propagadas por mosquitos que no se encuentran en el estado de Washington. Estas enfermedades ocurren en climas más tropicales, incluyendo los estados del sureste y en muchos lugares fuera de los Estados Unidos. Antes de viajar, conozca los riesgos de enfermedades propagadas por mosquitos en [su lugar de destino](#) y prevenga picaduras de mosquitos. El Departamento de Salud del estado de Washington está investigando el virus Zika y tiene información actualizada en [la página de internet](#).

El sitio web del [Departamento de Salud](#) (www.doh.wa.gov) es su fuente para *una dosis saludable de información*. También encuétrenos en [Facebook](#) y síganos en [Twitter](#).