



VACUNAS REQUERIDAS PARA EL INGRESO ESCOLAR, GRADOS K-12

Julio 1, 2015 – Junio 30, 2016

VACUNA	Kínder-4 ^o Grado	5 ^o -8 ^o Grado	9 ^o -12 ^o Grado
Hepatitis B	3 dosis Consulte los intervalos mínimos en la página 2 La 3ra dosis debe administrarse a partir de las 24 semanas de edad		3 dosis Consulte los intervalos mínimos en la página 2 La 3ra dosis debe administrarse a partir de los 4 meses de edad
Difteria, Tétanos y Tos ferina (DTaP/DT/Td/Tdap)	5 dosis (se requieren 4 dosis <i>si</i> la 4 ^{ta} dosis es administrada a partir de los 4 años) <i>además de</i> requerirse 1 dosis de Tdap para estudiantes en los grados 6^o-12^o si tienen 11 años o más de edad Para más información, vea la página 2		
Polio (IPV o OPV)	4 dosis (3 dosis si la 3 ^{ra} dosis se da a partir de los 4 años) <ul style="list-style-type: none"> • Toda dosis final administrada a partir del 7 de agosto del 2009, debe darse por lo menos a los 4 años de edad y con un mínimo intervalo de 6 meses a partir de la dosis previa. 	4 dosis (3 dosis <i>si</i> la tercera dosis se da a partir de los 4 años)	
Sarampión, Paperas y Rubéola	2 dosis		
Varicela	2 dosis 0 El proveedor de salud verifica que se padeció la enfermedad.	Recomendada pero no requerida.*	

* Para el ciclo escolar 2016-2017, la ley estatal requerirá que todos los estudiantes de 9^o-12^o grados tienen 2 dosis de la vacuna varicela.

- Para información sobre la edad y espacio mínimos recomendados, vea la tabla de *Edad e intervalos mínimos para dosis de vacunas validas* en la página 2.
- Para más información detallada, revise el Sumario de los Requisitos de Vacunación Individuales en www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/Schools/Immunization/VaccineRequirements.aspx (disponible solamente en inglés).

Edad e intervalos mínimos para dosis de vacunas validas

Vacunas	Núm. de dosis	Edad mínima	Intervalo mínimo entre dosis	Notas
Hepatitis B HepB	Dosis 1	Nacimiento (K-12 ^º)	4 semanas entre dosis 1 y 2 (K-12 ^º)	<ul style="list-style-type: none"> Las 2 dosis son validas si la vacuna Recombivax HB[®] para adultos es administrada entre las edades de 11 y 15 años espaciadas por 4 meses o más.
	Dosis 2	4 semanas (K-12 ^º)	8 semanas entre dosis 2 y 3 (K-12 ^º)	
	Dosis 3	24 semanas (K- 7 ^º) 4 meses (8 ^º -12 ^º)	16 semanas entre dosis 1 y 3 (K-7 ^º) 12 semanas entre dosis 1 y 3 (8 ^º 12 ^º)	
Difteria, Tétanos y Tos ferina DTaP/DT	Dosis 1	6 semanas	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> DTaP: para niños hasta la edad de 6 años. Se recomienda un espacio de 6 meses entre dosis 3 y 4, pero un espacio de 4 meses o más es aceptable. Se recomienda que los niños entre 7 y 10 años de edad que no tienen la vacunación completa de DtaP reciban una dosis de Tdap, con las dosis adicionales de Td si son necesarios. Una dosis de DtaP a partir de los 7 años se sustituye por una dosis de Tdap; no se requiere más dosis de Tdap. No se requiere Tdap para los niños que tienen 11 y 12 años de edad.
	Dosis 2	10 semanas	4 semanas entre dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	6 mese entre dosis 3 y 4	
	Dosis 4	12 meses	6 mese entre dosis 4 y 5	
	Dosis 5	4 años	–	
Tétanos, difteria y tos ferina Tdap	Dosis 1	Se recomienda 10 años. Vea las notas para las excepciones.	–	<ul style="list-style-type: none"> Tdap: para niños a partir de los 7 años de edad. Si un estudiante no obtuvo las dosis de DtaP antes de 7 años de edad, se requiere Tdap seguido por 2 dosis de Td. Un estudiante que obtuvo Tdap entre 7 y 10 años cumple con este requisito. Puede administrarse sin importar el intervalo entre las vacunas DTaP o Td.
Tétanos y difteria Td	Dosis 1	7 años	5 años	<ul style="list-style-type: none"> Td: para niños a partir de los 7 años de edad. Se requieren 3 dosis de la vacuna Td si comenzaron la serie a partir de los 7 años, de preferencia con una dosis única de Tdap como primera dosis.
Polio IPV u OPV	Dosis 1	6 semanas	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> No es obligatoria para los estudiantes a partir de los 18 años de edad. Si un estudiante obtuvo todas las dosis antes del 7 de agosto del 2009, un intervalo mínimo de 4 semanas tiene que haber separado todas las dosis y la edad mínima es de las 18 semanas en adelante.
	Dosis 2	10 semanas	4 semanas entre dosis 2 y 3	
	Dosis 3	14 semanas	6 mese entre dosis 3 y 4	
	Dosis 4	4 años	–	
Sarampión, Paperas y Rubéola MMR o MMRV	Dosis 1	12 meses	4 semanas entre dosis 1 y 2	<ul style="list-style-type: none"> La vacuna MMRV (MMR + varicela) puede usarse en lugar de las vacunas MMR y varicela por separado. Tiene que recibirse el mismo día que la vacuna VAR o por lo menos 28 días. El periodo de gracia de 4 días APLICA entre dosis de vacunas virales atenuadas del mismo tipo, como MMR/MMR. NO aplica el periodo de gracia de 4 días entre la dosis 1 y la 2 de vacunas virales atenuadas de diferentes tipos, como entre MMR y Varicela o MMR y gripe atenuada.
	Dosis 2	13 meses	–	
Varicela VAR	Dosis 1	12 meses	3 mese entre dosis 1 y 2 (12 meses-12 años) 4 semanas entre dosis 1 y 2 (tienen 13 años o más de edad)	<ul style="list-style-type: none"> Se recomienda un espacio de 3 meses entre las dosis de varicela, pero un promedio mínimo de 28 días es aceptable. El mínimo de 13 meses de edad es aceptable. Tiene que recibirse el mismo día que la vacuna MMR o por lo menos 28 días aparte. El periodo de gracia de 4 días APLICA entre las dosis de vacunas virales atenuadas del mismo tipo; NO aplica entre las dosis de vacunas virales atenuadas de diferentes tipos.
	Dosis 2	15 meses	–	

Si usted tiene una discapacidad y necesita este documento en otro formato, por favor llame al 1-800-525-0127 (TDD/TTY llame al 711).

DOH 348-051 January 2015 Spanish