



VACUNAS OBLIGATORIAS PARA ASISTIR A LA GUARDERÍA/PREESCOLAR¹

1 de julio de 2009 - 30 de junio de 2010

Mes, día y año necesarios para el registro de todas las vacunas.

NOTA: Los cuadros sombreados indican que no se requieren dosis nuevas con respecto al cuadro anterior.

Edad	A los 3 meses de edad (el último día del 2º mes o antes)	A los 5 meses de edad (el último día del 4º mes o antes)	A los 7 meses de edad (el último día del 6º mes o antes)	A los 16 meses de edad (el último día del 15ª mes o antes)	A los 19 meses de edad (el último día del 18ª mes o antes)	A los 24 meses de edad (el último día del 23ª mes o antes)	A los 7 años de edad (el último día del 6º año o antes) o al entrar al jardín infantil ²	
Vacuna 3	2 dosis de Hep B Puede administrarse la 1ª al nacer	2 dosis de Hep B			3 dosis de Hep B Puede administrarse tan pronto como a los 6 meses	3 dosis de Hep B Se puede completar la serie tan pronto como a los 6 meses de nacido		
	1 dosis de DTaP	2 dosis de DTaP	3 dosis de DTaP	3 dosis de DTaP	4 dosis de DTaP Puede administrarse la dosis 4 a partir de los 12 meses de edad siempre y cuando haya un intervalo de 6 meses entre la dosis 3 y la dosis 4	4 dosis de DTaP	5 dosis de DTaP Si la dosis 4 de la vacuna DTaP se recibe antes de cumplir los 4 años, se necesita la dosis 5 antes de cumplir los 7 años o antes de entrar a la escuela	
	1 dosis de Hib	2 dosis de Hib	3 dosis de Hib	4 dosis de Hib	4 dosis de Hib Inmunización completa es 4 dosis a los 16 meses, pero: <ul style="list-style-type: none"> Se requiere tres dosis si sólo se administraron 2 dosis antes de los 12 meses; o Se requiere dos dosis si ambas se administraron entre los 12 y 15 meses; o Se requiere una dosis SI la única dosis se ha administrado a los 15 meses de edad o después. 	Hib no se administra después de los 5 años de edad		
	1 dosis de polio	2 dosis de polio	2 dosis de polio		3 dosis de polio	3 dosis de polio	4 dosis de polio	
	1 dosis de vacuna neumocócica (PCV)	2 dosis de vacuna neumocócica (PCV)	3 dosis de vacuna neumocócica (PCV)	4 dosis de vacuna neumocócica (PCV)	4 dosis de vacuna neumocócica (PCV) Inmunización completa es 4 dosis a los 16 meses, pero: <ul style="list-style-type: none"> Se requiere tres dosis si sólo se administraron 2 dosis antes de los 12 meses; o Se requiere dos dosis si ambas se administraron entre los 12 y 24 meses; o Se requiere una dosis SI la única dosis se ha administrado a los 24 meses de edad o después. 	La vacuna neumocócica (PCV) no se administra después de los 5 años de edad		
	MMR no se administra antes de los 12 meses de edad				1 dosis de MMR	1 dosis de MMR		2 dosis de MMR
	La varicela no se administra antes de los 12 meses de edad				1 dosis de varicela	1 dosis de varicela		2 dosis de varicela

¹ Para asistir a una escuela pública/privada o guardería autorizada en el estado de WA, cada niño debe presentar un impreso firmado del **Certificado del estado de inmunización** mostrando prueba de 1) inmunización total según el Programa recomendado de vacunación infantil 2007 (visite <http://www.doh.wa.gov/cfh/Immunize/schools/vaccine.htm>), 2) comienzo de un programa de vacunación, 3) exención médica (con la firma del proveedor de atención médica), **O** 4) exención personal o religiosa (con la firma del padre/madre/tutor legal).

² Los niños en edad escolar que participan en programas antes y después de la escuela deben satisfacer los requisitos de vacunación para su grado correspondiente.

³ No hay un intervalo máximo entre dosis. Incluso si no se satisface el intervalo recomendado, no es necesario reiniciar la serie.