모유만을 수유하는 생후 6 개월 이전 유아(단단한 음식 섭취) 평가 문항

질문		위험/목적
귀 자녀의 건강, 영양 및 안전 상태와 관련하여 몇 가지를 여쭤보겠습니다. 모든 대상자에게 이 질문을 드립니다. 궁금하거나 염려되시는 점이 있을 경우 다시 방문하여 해결해 드리겠습니다. 그래도 괜찮으시겠습니까?		친밀감 형성
	귀 자녀의 건강 상태는 어떻습니까?	친밀감 형성
1.	의사가 귀 자녀의 건강/의료상 문제에 관해 진단을 내린 적이 있습니까? ● (있는 경우) 구체적으로 설명해 주십시오.	<해당되는 의료상 위험 선택>
2.	귀 자녀가 최근에 큰 수술을 받았거나 심한 부상 또는 화상을 입은 적이 있습니까? ● (있는 경우) 구체적으로 설명해 주십시오.	최근의 큰 수술, 외상, 화상
3.	귀 자녀에게 현재 투여 중인 약물이 있습니까? ● (있는 경우) 구체적으로 설명해 주십시오.	약물 영양소 상호작용
4.	귀 자녀가 비타민 또는 기타 보조 식품을 섭취하고 있습니까? ● (섭취하는 경우) 어떤 종류이며, 양은 어느 정도입니까? ● 귀 자녀가 비타민 D 보조제를 섭취하고 있습니까?	**부적절하거나 과도한 영양 공급,** 비타민 D 섭취 부족
5.	모유 수유 상태에 관해 말씀해 주십시오. ● 자녀가 배고픔을 느낀다는 것을 어떻게 확인하십니까? 그리고 배가 부른 것은 어떻게 확인하십니까? ● 24 시간 동안 몇 번이나 모유를 수유하십니까? ● 젖을 먹이는 시간은 좌/우 가슴 각각 어느 정도입니까?	발달/섭취의 불균형, 모유 수유 합병증, 불충분한 모유 수유 주기(생후 6 개월 이전), **극히 제한적인 영양 공급**
6.	귀 자녀에게 병에 담긴 모유를 먹이고 계십니까? ● (해당되는 경우) 모유를 얼마나 오래 보관하십니까? ● 수유 후 남은 모유는 어떻게 처리하십니까? ● 자녀와 함께 외출할 경우 어떤 방법으로 모유를 보관하십니까?	안전하지 않은 방식으로 모유/유동식 처리/보관
7.	귀 자녀는 병을 쥔 채 잠이 듭니까? ● (해당되는 경우) 귀하가 아이를 안고 계십니까? ● 병 안에 시리얼을 넣으신 적이 있습니까?	부적절한 방식으로 병/컵을 사용
8.	귀 자녀에게 다른 마실 거리를 주십니까? 양이 어느 정도입니까? (우유, 염소젖, 스포츠 음료, 단 맛이 나는 음료 등으로 환산할 경우)	부적절한 모유/유동식 대용식, 부적절한 방식으로 병/컵을 사용, 설탕 함유 음료 섭취
9.	귀 자녀에게 컵을 주신 적이 있습니까? ● (있는 경우) 컵에 든 내용물이 무엇입니까?	부적절한 방식으로 병/컵을 사용

모유만을 수유하는 생후 6 개월 이전 유아(단단한 음식 섭취)
평가 문항

	질문	위험/목적
10.	귀 자녀에게 어떤 단단한 음식을 먹이고 계십니까? • 양이 어느 정도입니까? • 자녀에게 손으로 집어먹는 음식을 주고 계십니까? (예: 완두콩, 자른 바나나, 치리오스) • 귀 자녀가 포도, 건포도, 견과류, 팝콘 또는 칩을 먹습니까?	너무 빠른 단단한 음식 섭취(생후 4 개월 이전), 발달/섭취 불균형
11.	귀 자녀는 -꿀을 바른 고무 젖꼭지를 사용하거나, 꿀이 함유된 통밀 크래커를 먹습니까? -미살균 우유 또는 생과일 주스를 먹습니까? -데우지 않은 핫도그를 먹습니까? -날달걀 또는 덜 익힌 달걀을 먹습니까?	오염 가능성이 있는 식품
12.	어떤 이유로 귀 자녀에게 섭취를 제한하는 음식이 있습니까?	**극히 제한적인 영양 공급 섭식에 심각한 영향을 주는 음식 관련 알레르기,** 유당 분해효소 결핍증
13.	귀 가정에 흡연자가 있습니까? • (있는 경우) 구체적으로 설명해 주십시오.	간접 흡연
14.	귀하 또는 자녀가 타인으로부터 상해를 입은 경험이 있습니까? • (있는 경우) 구체적으로 설명해 주십시오.	학대 경험(과거 6 개월 이내)

참고: 위험 요소 면담 진행 도중 위 질문 외에 아래의 추가 위험 요소도 함께 확인해 주십시오.

- **체중 발달 부진**
- 위탁 양육(과거 6 개월 이내)
- 알코올/약물 중독 증상이 있는 도우미
- 산모의 약물 사용(임신 중)
- 도우미가 음식 섭취에 관한 판단 능력이 부족함
- 떠돌이
- 노숙
- 1 자녀 모유 수유 여성의 영양 섭취 부족 위험 가능성
- 2 자녀 모유 수유 여성의 영양 섭취 부족 위험 가능성
- 4 자녀 모유 수유 여성의 영양 섭취 부족 위험 가능성
- WIC 수혜 자격 여성의 자녀(생후 6 개월 이전)

결정(확인된 위험 요소가 없는 경우): 영양 섭취 지침 미준수(4-12 개월)

이 출판물은 장애인 여러분이 요청할 경우 다른 형식(예: 점자)으로 입수하실 수 있습니다.
요청하시려면 1-800-841-1410(TDD/TTY 1-800-833-6388)으로 전화하십시오.

본 기관은 기회 균등 서비스 제공자입니다.
워싱턴주 WIC 영양 프로그램은 차별을 금지합니다.

DOH 960-080 December 2010 Korean

PUBLIC HEALTH
ALWAYS WORKING FOR A SAFER AND HEALTHIER WASHINGTON

Washington State Department of Health