

# چارت واکسین های ضروری بخاطر مراقبت از طفل برای والدین



راهنمای ها: برای اینکه ببینید کدام واکسین برای مراقبت طفل ضروری است، سن طفل خود را پیدا کنید و برای یافتن واکسین ها و دوزهای مورد نیاز به آن ردیف ببینید. اطفال باید حداقل فواصل و سن واکسین را داشته باشند تا شرایط لازم را برآورده کنند. لطفاً اگر سوالی دارید با ارائه دهنده مراقبت های صحتی یا ارائه دهنده مراقبت از طفل خود صحبت نمایید.

واریسلا (آبله مرغان)	سرخکان، گوشک، روبیلا	کنژوگه نیوموکوکل	پولیو	هیپ انفلونزای هیموفلیس نوع ب	اسهال، تیتانوس، سیاه سرفه	هپتایتس B	
Varicella	MMR	PCV	Polio	HIB	DTaP	Hepatitis B	
به طور معمول قبل از 12 ماهگی داده نمی شود	به طور معمول قبل از 12 ماهگی داده نمی شود	1 دوز	1 دوز	1 دوز	1 دوز	2 دوز	در 3 ماهگی
		2 دوز	2 دوز	2 دوز	2 دوز	2 دوز	در 5 ماهگی
		3 دوز	2 دوز	2-3 دوز**	3 دوز	2 دوز	در 7 ماهگی
1 دوز	1 دوز	4 دوز**	2 دوز	3-4 دوز**	3 دوز	2 دوز	16 ماهگی
1 دوز	1 دوز	4 دوز**	3 دوز	3-4 دوز**	4 دوز	3 دوز	در 19 ماهگی
2 دوز	2 دوز	به طور معمول به اطفال 5 ساله و بالاتر داده نمی شود	4 دوز**	به طور معمول به اطفال 5 ساله و بالاتر داده نمی شود	5 دوز**	3 دوز	در 7 سالگی یا دوره قبل از مکتب/ورود به مکتب در < 4 سالگی*

\*اطفالی که در صنف قبل از دوره مکتب- صنف 12ام می روند باید شرایط واکسیناسیون را برای صنف خود در مکتب داشته باشند.  
\*\*ممکن است دوزهای واکسین با کمتر از مقدار ذکر شده قابل قبول باشد، نظر به زمان تزریق آنها.

چارت شرایط قبل از دوره مکتب- صنف 12ام و منابع اضافی واکسیناسیون را می توان در این آدرس یافت میشود: [www.doh.wa.gov/SCCI](http://www.doh.wa.gov/SCCI)  
معلومات مربوط به سایر واکسین های مهم که برای حضور مراقبت طفل نیاز نیستند را در این آدرس بیابید: [www.immunize.org/cdc/schedules](http://www.immunize.org/cdc/schedules).

برای درخواست این سند در فارمت دیگر، با شماره 1-800-525-0127 در تماس شوید.

افراد ناشنوا یا دارای مشکلات کم شنوا، لطفاً با نمبر 711 (Washington Relay) به تماس شده یا به آدرس [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov) ایمیل ارسال نمایند. DOH 348-425 Dec. 2022 Dari