

소아 COVID-19 및 독감 백신

부모/보호자가 알아야 할 사항

생후 6개월 이상 아동에게는 COVID-19 및 독감 백신 접종이 권장됩니다.

아이들은 왜 백신 접종을 받아야 하나요?

미국에서 독감은 백신으로 예방할 수 있는 질병 중 주요 사망 원인의 하나입니다. 미국에서는 1,500만 명 이상의 아동이 COVID-19에 감염되었습니다. 생후 6개월 미만의 영유아는 COVID-19 및 독감 백신 접종을 받을 수 없기 때문에 주변인 모두가 백신 접종을 받는 것이 중요합니다. 건강한 아동이라도 COVID-19와 독감으로 인해 많이 아플 수 있으며, 아프다는 사실을 알기도 전에 다른 사람에게 전염시킬 수 있습니다.

이 백신들은 COVID-19 및 독감으로 인한 중증 질병, 입원 및 사망으로부터 아동을 보호하는 데 도움이 됩니다. 편의상은 물론 해당 질병에 대한 최선의 보호를 위해 **COVID-19 및 독감 백신을 동시에 접종할 수 있습니다.**

어떻게 우리 아이에게 백신 접종을 해야 하나요?

워싱턴주에서는 18세까지 아동에게 모든 권장 백신을 무료로 제공합니다. 귀 자녀의 소아과 의사나 일반 진료소에 COVID-19 및 독감 백신을 제공하는지 문의하십시오.

아직 담당 의료 서비스 제공자가 없는 가족은 **Help Me Grow(소아 성장 지원 프로그램) WA** 핫라인에 **1-800-322-2588**번으로 전화하거나 **ParentHelp123.org** 에서 의료 서비스 제공자, 진료소 또는 기타 의료 자원을 찾을 수 있습니다. 이 서비스는 무료이며 언어 지원도 제공됩니다.

또한 **Vaccines.gov** 에서 COVID-19 및 독감 백신을 보유하고 있으며 아동 백신 접종을 제공하는 인근의 접종처 목록을 확인할 수 있습니다.

우리 아이는 몇 번 접종해야 하나요?



독감

- 8세 미만의 영유아 및 아동이 **처음** 독감 백신을 접종하는 경우 **1개월 간격으로 2회** 접종을 받아야 합니다.
- 과거에 독감 백신을 접종한 경우에는 **1회만** 접종을 받으면 됩니다.

COVID-19

- 생후 6개월~4세 아동은 Pfizer 시리즈 3회 또는 Moderna 시리즈 2회 접종을 받습니다.
- 5세 이상 아동은 Pfizer 또는 Moderna 백신을 1회 접종받습니다.

중등도 또는 중증의 면역저하자로 생후 6개월 이상 아동은 3회 접종을 받아야 하며 마지막 백신 접종 후 최소 2개월 경과 시 추가 접종을 받을 수 있습니다.

이용할 수 있는 COVID-19 및 독감 백신 옵션과 귀하와 귀 가족에게 가장 적합한 옵션에 대해서는 담당 의료 서비스 제공자에게 문의하십시오.



COVID-19 백신 관련 문의:



웹사이트: **VaccinateWA.org/kids**



전화: **1-833-VAX-HELP**(1-833-829-4357)로 전화, # 누름

언어 지원이 제공됩니다.



자주 묻는 질문: COVID-19 및 독감 백신

우리 아이가 이전에 백신 접종을 받았다면 개량 백신을 접종해야 하나요?

예. COVID-19 및 독감 백신은 다가오는 호흡기 바이러스 시즌에 가장 흔히 나타날 것으로 예상되는 바이러스 변종에 맞게 개량되었습니다. 백신은 효과적이지만 시간이 지나면서 보호 효과가 약화되는 것으로 알려져 있습니다. 최신 백신 접종을 유지하는 것이 이러한 질병에 대한 지속적인 보호를 위해 가장 효과적인 방법입니다. 보호 효과는 백신 접종 후 약 2주 경과 후에야 나타납니다.

우리 아이에게 백신이 안전한가요?

예. COVID-19와 독감 백신은 아동에게 매우 안전한 것으로 여겨집니다. 청소년을 대상으로 한 COVID-19 백신의 임상시험에서 심각한 부작용은 발견되지 않았습니다. 독감 백신은 70년이 넘도록 안전하게 사용되어 왔습니다. 백신은 안전성과 유효성에 대한 테스트를 거치고 지속적으로 모니터링됩니다. 심각한 부작용은 극히 드뭅니다. COVID-19 및 독감 백신은 생후 6개월 이상 모두에게 권장됩니다.

이러한 백신 접종 후 아동에게 흔히 나타나는 부작용은 무엇인가요?

가장 흔히 나타나는 부작용은 팔 통증, 피로, 두통, 근육통입니다. 부작용은 일반적으로 경증 내지 중등도로 나타나며 백신 접종 후 2일 이내에 발생했다가 보통 1~2일 이내에 사라집니다. COVID-19 백신과 심근염/심낭염 간의 연관성이 있다는 증거가 제시되었습니다. 그러나 해당 사례는 드물며 COVID-19 감염으로 인해 발생하는 경우가 더욱 흔합니다.

아동이 COVID-19 및/또는 독감에 감염될 경우 겪게 되는 건강상 위험이 백신 부작용의 위험보다 훨씬 더 높습니다. 부작용은 백신이 효과가 있다는 징후이기도 하며, COVID-19 및 독감 백신 모두 질병을 유발하지 않습니다.

접종 시 아이가 지참해야 하는 것은 무엇인가요?

대부분 18세 미만 아동의 경우 부모와 보호자가 해당 아동의 백신 접종에 대한 동의서를 제공해야 합니다. 동의를 위해 필요한 것이 무엇인지 백신 접종처에 문의하십시오. 접종 예약을 할 때 귀 자녀에게 특별한 도움이 필요한지 여부를 반드시 알려 주십시오. 장난감이나 봉제인형 등 귀 자녀가 편안함을 느낄 수 있는 물건을 챙기는 것도 도움이 될 수 있습니다.

추가 질문이 있는 경우, 어디로 문의해야 하나요?

VaccinateWA.org/kids에서 추가 질문에 대한 답변이 제공됩니다. 또한 귀하가 신뢰하는 의료 서비스 제공자와 상담하셔도 됩니다.



여기에 로고 입력

여기에 로고 입력

DOH 820-249 December 2023 Korean

본 문서를 다른 형식으로 요청하려면 1-800-525-0127로 전화하십시오.

청각 장애가 있는 고객은 전화 711(Washington Relay) 또는 이메일 doh.information@doh.wa.gov로 연락하시면 됩니다.