



# កុមារនិងយុវជនដែលមាន តម្រូវការសុខភាពពិសេស www.doh.wa.gov/cyshcn

## ព័ត៌មានអំពីវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 និងព័ត៌មានអំពីវ៉ាក់សាំងជំងឺផ្តាសាយធំ

### ព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកថែទាំ

ការចាក់វ៉ាក់សាំងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ Children and Youth with Special Health Care Needs (CYSHCN, កុមារនិងយុវជនដែលមានតម្រូវការថែទាំសុខភាពពិសេស) ដោយសារពួកគេមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងក្នុងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងផ្តាសាយធំ។ នេះក៏ព្រោះតែពួកគេមានបញ្ហាសុខភាពក្នុងខ្លួនស្រាប់

និងមានការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព។ ពួកគេក៏អាចមានបញ្ហាក្នុងការពាក់ម៉ាស់ លាងសម្អាតដៃ និងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពពីអ្នកផ្សេងទៀតផងដែរ។

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ) និង American Academy of Pediatrics (បណ្ឌិតសភាវេជ្ជសាស្ត្រកុមារអាមេរិក) ណែនាំឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19

និងផ្តាសាយធំសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលមានអាយុ 6 ខែឡើងទៅ។

### COVID-19

- វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ម៉ាក Pfizer ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់មនុស្សអាយុ 6 ខែឡើងទៅ។
- វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ម៉ាក Moderna ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់មនុស្សអាយុ 6 ខែឡើងទៅ។
- វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ម៉ាក Novavax មានផ្តល់ជូនសម្រាប់មនុស្សអាយុ 12 ឆ្នាំឡើងទៅ។
- វ៉ាក់សាំងទាំងនេះមានសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពណាស់ក្នុងការការពារកុមារ និងយុវជនពីជំងឺផ្លូវដង្ហើម។

### ផ្តាសាយធំ

- ថ្នាំចាក់៖ សម្រាប់មនុស្សអាយុ 6 ខែដល់ 64 ឆ្នាំ  
មិនមានការណែនាំថាម៉ាកវ៉ាក់សាំងជំងឺផ្តាសាយធំមួយណាជាងមួយណានោះទេ។  
វ៉ាក់សាំងជំងឺផ្តាសាយធំទាំងអស់សម្រាប់ឆ្នាំ 2023-24 ការពារទល់នឹងវីរុសផ្តាសាយធំ 4 ប្រភេទ។  
ធាតុផ្សំវ៉ាក់សាំងត្រូវបានអាប់ដេតរៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីឱ្យត្រូវនឹងប្រភេទវីរុសដែលឆ្លងរាលដាលថ្មីបំផុត។
- ស្រ្តាយបាញ់ច្រមុះ៖ នេះជាវ៉ាក់សាំងរស់ដែលត្រូវបានកែលក្ខណៈ។ វាត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់មនុស្សអាយុ 2 ឆ្នាំដល់ 49 ឆ្នាំ។ វាមិនត្រូវបានណែនាំសម្រាប់មនុស្សមានផ្ទៃពោះ មនុស្សមានប្រព័ន្ធភាពសុំចុះខ្សោយ មនុស្សរ៉ែយចំណាស់ និងមនុស្សមានរបួសលក្ខណៈវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនទេ។
- ជួសកម្រិតខ្ពស់ និងបន្ថែមឱសថជំនួយ៖ បង្កើតបានជាប្រតិកម្មភាពសុំខ្លាំងជាងមុន។  
វាត្រូវបានណែនាំសម្រាប់មនុស្សធំអាយុ 65 ឆ្នាំឡើង។

### ហេតុអ្វីកុមារត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំង?

ការចាក់វ៉ាក់សាំងជួយរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារ ខណៈពេលនៅសាលារៀន ក៏ដូចជាជាមួយមិត្តភក្តិ និងគ្រួសារ។ កុមារដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងមិនងាយឈឺធ្ងន់ សម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ឬស្លាប់នោះទេ ប្រសិនបើពួកគេឆ្លងជំងឺ COVID-19។

- កុមារដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចវិវឌ្ឍទៅជា**បញ្ហាសុខភាពរយៈពេលខ្លី និងវែង** (ជាភាសាអង់គ្លេស) រួមទាំង “ជំងឺ COVID-19 រយៈពេលវែង”។ បញ្ហាសុខភាពមួយចំនួនដូចជា **សហគោតសញ្ញារលាកពហុប្រព័ន្ធ (MIS-C)**

(ជាភាសាអង់គ្លេស) អាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ ហើយធ្វើឱ្យមានការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងស្លាប់ទៀតផង។  
ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពកុមារ។

- កុមារដែលឆ្លងជំងឺផ្តាសាយធំអាចវិវឌ្ឍទៅជាបញ្ហាសុខភាពរយៈពេលខ្លី និងវែង រួមទាំងបញ្ហាបេះដូង។

ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាព និងសុខភាពកុមារ។

**CYSHCN អាចមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងក្នុងការឈឺធ្ងន់ដោយសារជំងឺ COVID-19 និងផ្តាសាយធំ**

កុមារដែលមានតម្រូវការថែទាំសុខភាពពិសេស បុគ្គលិកសុខភាពផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រជាក់លាក់ (ជាភាសាអង់គ្លេស)  
ងាយនឹងឈឺធ្ងន់ ប្រសិនបើពួកគេឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬផ្តាសាយធំ។  
ការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជាវិធីដ៏សំខាន់ខ្លាំងក្នុងការការពារកុមារពីជំងឺផ្លូវដង្ហើម។

វិធីមួយទៀតក្នុងការការពារកុមារគឺត្រូវប្រាកដថា អ្នកផ្សេងទៀតក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំង  
និងជួសជុំគ្រប់ចំនួន។ នេះមានន័យថា ប្រការសំខាន់គឺឪពុកម្តាយ និងអ្នកថែទាំត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងដែរ។

**វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 និងផ្តាសាយធំមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ CYSHCN**

កុមារ និងមនុស្សធំដែលមានបញ្ហាសុខភាពស្រាប់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 បាន។  
មូលហេតុតែមួយគត់ដែលមនុស្សម្នាក់មិនគួរចាក់វ៉ាក់សាំងគឺ  
ប្រសិនបើបុគ្គលនោះមានបញ្ហាប្រតិកម្មដែលអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត (ប្រតិកម្មដែលត្រូវការបំពង់ចាក់ថ្នាំស្វ័យប្រវត្តិ)  
ជាមួយធាតុផ្សំក្នុងវ៉ាក់សាំងណាមួយ។

- ធាតុផ្សំវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 (ជាភាសាអង់គ្លេស)
- ធាតុផ្សំវ៉ាក់សាំងជំងឺផ្តាសាយធំ (ជាភាសាអង់គ្លេស)

អត្ថប្រយោជន៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺមានច្រើនជាងហានិភ័យ។ ពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពកូនរបស់អ្នក  
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬក្តីបារម្ភអំពីវ៉ាក់សាំង។

**ផលប៉ះពាល់**

ហានិភ័យសុខភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬផ្តាសាយធំគឺខ្ពស់ខ្លាំងជាងហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់របស់វ៉ាក់សាំង។  
វាជារឿងធម្មតាដែលកុមារមានអារម្មណ៍ថាមានផលប៉ះពាល់ខ្លះៗ បន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង។ ផលប៉ះពាល់ទូទៅបំផុតគឺ៖

- ឈឺដៃ
- អស់កម្លាំង
- គ្រុនក្តៅ
- ឈឺសាច់ដុំ
- ឈឺក្បាល
- ព្រីរងា

សាកសួរអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពកូនរបស់អ្នកអំពីរបៀបធ្វើឱ្យកូនរបស់អ្នកកាន់តែមានសុខភាព  
បើគាត់មានផលប៉ះពាល់។ អ្នកក៏អាចធ្វើឱ្យគាត់មានសុខភាពដោយសកម្មភាពស្ងាត់ៗផងដែរ។  
ផលប៉ះពាល់ភាគច្រើនបាត់ទៅវិញក្នុងរយៈពេល 1 ទៅ 2 ថ្ងៃ។

ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកមានប្រតិកម្មអាលែកហ្សឺធ្ងន់ធ្ងរជាមួយវ៉ាក់សាំងផ្សេងទៀត គាត់ក៏នៅតែអាចចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ  
COVID-19 និងផ្តាសាយធំបានដែរ។ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនឹងប្រាប់ឱ្យគាត់រង់ចាំប្រហែល 30 នាទីក្រោយពីចាក់រួច  
ដើម្បីមើលក្រែងមានប្រតិកម្មភ្លាមៗណាមួយ។

ហានិភ័យដែលអាចមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាមួយវ៉ាក់សាំងទាំងនេះមានកម្រិតទាបណាស់។  
ហានិភ័យក្នុងការវិវឌ្ឍទៅជាភាពសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើមគឺខ្ពស់ខ្លាំងជាងហានិភ័យក្នុងការបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់  
ធ្ងរក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចមានពីការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19

នៅទីនេះ៖

[វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19](#) (ជាភាសាអង់គ្លេស)

[វ៉ាក់សាំងជំងឺផ្កាសាយធំ](#) (ជាភាសាអង់គ្លេស)

ប្រសិនបើអ្នកមានការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 សូមទូរសព្ទទៅលេខ 9-1-1 ជាបន្ទាន់។

**តើខ្ញុំអាចនាំកូនខ្ញុំទៅចាក់វ៉ាក់សាំងតាមវិធីណា?**

សាកសួរគ្រូពេទ្យកុមាររបស់អ្នកថា តើពួកគេផ្តល់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 និងផ្កាសាយធំឬអត់។ បើអត់ទេ អ្នកអាចប្រើទំព័រស្វែងរកទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង (ជាភាសាអង់គ្លេស) របស់យើង។

**ការស្នើសុំការសម្របសម្រួល**

នៅពេលអ្នកធ្វើការណាត់ជួប ឬទៅដល់ទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង សូមប្រាប់បុគ្គលិកឱ្យដឹង ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកត្រូវការជំនួយបន្ថែម។ ឧទាហរណ៍ ប្រហែលជាគាត់មិនអាចពាក់ម៉ាស់ ឬអង្គុយរង់ចាំក្រោយពេលចាក់រួច។ ប្រហែលជាបន្ទប់មានសំឡេងរំខាន និងពន្លឺភ្លឺប៉ះពាល់ដល់គាត់។ អ្នកអាចស្នើសុំការសម្របសម្រួលដូចជា៖

- ដើរចុះឡើងក្រោយពេលចាក់ ជំនួសឱ្យការអង្គុយ។
- ស្នើឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាចាក់វ៉ាក់សាំងកូនរបស់អ្នកក្នុងរថយន្តរបស់អ្នក។
- ស្នើឱ្យដៃគូដែលកូនរបស់អ្នកចូលចិត្តនៅក្បែរគាត់ អំឡុងពេលណាត់ជួប។
- ស្នើឱ្យចាក់វ៉ាក់សាំងកូនរបស់អ្នកក្នុងបន្ទប់ស្ងាត់ ឆ្ងាយពីហ្វូងមនុស្ស។

**តើខ្ញុំអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបាននៅកន្លែងណា?**

ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបំផុតអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងយុវជន៖

សម្រាប់ជំងឺ COVID-19 សូមចូលមើល [VaccinateWA.org/Kids](https://www.vaccinatewa.org/kids)

សម្រាប់ជំងឺផ្កាសាយធំ សូមចូលមើល [Flufreewa.org](https://www.flufreewa.org) (ជាភាសាអង់គ្លេស)

ធនធានផ្សេងទៀត៖

- ការណែនាំពី American Academy of Pediatrics អំពី [ការថែទាំ CYSHCN អំឡុងពេលឆ្លងរាលដាលជាសកល](#) (ជាភាសាអង់គ្លេស)។
- ព័ត៌មាន និងជំនួយទាក់ទងនឹងជំងឺផ្កាសាយធំរបស់ CDC សម្រាប់ [មនុស្សមានពិការភាព](#) (ជាភាសាអង់គ្លេស)។
- [ធនធានទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ CYSHCN](#) (ជាភាសាអង់គ្លេស) ពី Lucile Packard Foundation។
- [ព័ត៌មាន និងជំនួយទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19](#) (ជាភាសាអង់គ្លេស) ពី Informing Families (ជូនដំណឹងគ្រួសារ) ។
- [ការណែនាំអំពីជំងឺផ្កាសាយធំសម្រាប់មាតាបិតា](#) (ជាភាសាអង់គ្លេស) ដើម្បីជួយការពារ និងថែទាំកូនៗពី/ដែលមានជំងឺផ្កាសាយធំ។
- [ប័ណ្ណទំនាក់ទំនងវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19](#) (ជាភាសាអង់គ្លេស) របស់ Department of Health និង [រឿងរ៉ាវសង្គម](#) របស់ Center for Dignity in Healthcare for People with Disabilities (មជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងការថែទាំសុខភាពសម្រាប់មនុស្សមានពិការភាព) អាចជួយធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយកុមារ ឬយុវជនអំពីវ៉ាក់សាំង។

- ខ្សែទូរសព្ទ (360-947-3330) របស់ BLIND COVID Access អនុញ្ញាតឱ្យជនពិការភ្នែក និងខ្សោយភ្នែកសួរសំណួរអំពីលទ្ធភាពទទួលបានធនធានទាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19។ [BLINDCOVID.com](https://www.blindcovid.com) (ជាភាសាអង់គ្លេស) នឹងរៀបចំធនធានបន្ថែម និងការធ្វើទំនាក់ទំនងអំពីការធ្វើតេស្តលើការចាក់វ៉ាក់សាំង ទីតាំងវ៉ាក់សាំង និងរបៀបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលឆ្លងរាលដាលជាសកល។
- សម្រាប់សំណួរជាក់លាក់អំពី CYSHCN សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅ [cyshcn@doh.wa.gov](mailto:cyshcn@doh.wa.gov)។

ដើម្បីស្នើសុំឯកសារនេះជាទម្រង់ផ្សេងទៀត សូមហៅទូរសព្ទមកលេខ 1-800-525-0127។  
 អតិថិជនដែលពិការត្រចៀកឬស្តាប់មិនសូវឮ សូមទូរសព្ទទៅលេខ 711 (Washington Relay) ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅ [civil.rights@doh.wa.gov](mailto:civil.rights@doh.wa.gov)។