

什么是口服抗病毒药物?

帮助 COVID-19 感染者缓解病情的药物。

如果您是易发 COVID-19 重症的高危群体,且在过去 5 天内 COVID-19 检测结果呈阳性,您可考虑口服抗病毒处方药。现有两种治疗药物: Paxlovid™(Pfizer) 和 legevirio (Merck)。根据您的年龄、病史及症状持续时间,可能符合服用其中一种 COVID-19 治疗药物的条件。

口服抗病毒治疗药物可阻止 SARS-CoV-2 病毒(导致 COVID-19 的病毒)在体内繁殖、减少体内的病毒数量或增强免疫力,从而有助于身体抵御 COVID-19。通过接受治疗,您可能不会出现严重症状,且降低病情恶化和需要住院治疗的几率。

• 如何口服抗病毒药物?

接受口服抗病毒药物治疗是指您要口服药物。您应按照医疗服务提供者的指示口服抗病毒治疗药物。若您漏服药物,请勿跳过或加服一剂。您应按照医嘱服用所有治疗药物,直至完成治疗或医疗服务提供者告知您停止服药。口服抗病毒药物可饭前或饭后服用,建议整片吞咽,而不要弄碎或压碎。


• 如果我有基础疾病,如肾病或肝病,该怎么办?

在服用任何药物之前,请告知医疗服务提供者您的病史。这包括告知您所患的任何疾病以及 目前在服用的处方药、非处方药、维生素及营养补充剂。

肾病或肝病患者在口服抗病毒药物之前,应告知医疗服务提供者自己的病情。医疗服务提供者会决定口服抗病毒治疗药物及剂量是否适合您。对于患有某些疾病的患者,不建议采用某些治疗药物。

• 如果我不符合口服抗病毒治疗药物的条件,该怎么办?

医疗服务提供者可能会决定您不符合口服抗病毒治疗药物的条件,或口服抗病毒治疗药物不适合您。这可能由于几种原因。您可能不符合所有资格标准,或您的疾病不适合服用某些治疗药物。请咨询医疗服务提供者,商讨最适合您的治疗方案。





DOH 825-029 May 2022 Simplified Chinese

若您需要本文档的其他格式,请致电 1-800-525-0127。失聪或听障客户请致电 711 (Washington Relay) 或发送电子邮件至 mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov。