Таблица обязательных прививок для детей в дошкольном заведении, предназначенная для



Инструкции. Чтобы узнать, какие вакцины требуются для дошкольного заведения, смотрите на тот ряд таблицы, который соответствует возрасту ребенка (указан в столбце слева). Чтобы соблюсти требования к вакцинации детей, необходимо придерживаться минимальных интервалов между прививками и учитывать возраст при вакцинации.

	Гепатит В	дифтерия, столбняк, коклюш	Вакцина против гемофильной инфекции типа b	Полиомиелит	пневмококковая конъюгированна я вакцина	корь, паротит, краснуха	ветряной оспы
	Hepatitis B	DTaP	Hib	Polio	PCV	MMR	Varicella
К 3 месяцам	2 дозы	1 доза	1 доза	1 доза	1 доза	Для детей возрастом до	Для детей возрастом до
К 5 месяцам	2 дозы	2 дозы	2 дозы	2 дозы	2 дозы	12 месяцев прививка не проводится в	12 месяцев прививка не проводится в
К 7 месяцам	2 дозы	3 дозы	2-3 дозы**	2 дозы	3 дозы	обязательном порядке	обязательном порядке
К 16 месяцам	2 дозы	3 дозы	3-4 дозы**	2 дозы	4 дозы**	1 доза	1 доза
К 19 месяцам	3 дозы	4 дозы	3-4 дозы**	3 дозы	4 дозы**	1 доза	1 доза
К 7 годам или к моменту поступления в дошкольное/ школьное учреждение (возраст около 4 лет*)	3 дозы	5 доз**	Для детей возрастом от 5 лет прививка не проводится в обязательном порядке	4 дозы**	Для детей возрастом от 5 лет прививка не проводится в обязательном порядке	2 дозы	2 дозы

^{*}Если дети посещают дошкольные учреждения (12-й класс школы), необходимо соблюдать соответствующие требования школы к вакцинации.

Таблицу требований для заведений дошкольного образования (12-й класс школы),

а также дополнительные ресурсы по вакцинации можно найти здесь: www.doh.wa.gov/SCCI

Информация о других важных вакцинах, которые не требуются для посещения дошкольного заведения: www.immunize.org/cdc/schedules.

^{**}Меньшее количество доз вакцин может быть допустимым (это зависит от того, когда были сделаны прививки).