


التوصيات المُحدّثة المتعلقة بتلقي اللقاحات المضادة لكوفيد-19 للأطفال من عمر 6 أشهر إلى 4 سنوات

يمكن أن يحمي لقاح كوفيد-19 المُعجّل فترة 2024-2025 الأطفال الصغار من المرض الشديد، والاحتجاز في المستشفى، وحتى الوفاة جرّاء الإصابة بكوفيد-19. وقد أثبتت الدراسات أن لقاحات كوفيد-19 تظلّ فعّالة في منعها وتقلل من شأن انخفاض مستوى الحماية بمرور الوقت.

يظل الحصول على أحدث لقاح مضاد لكوفيد-19 الطريقة الأكثر فعالية لمتابعة هذه الحماية.

اطلع على المخطط أدناه لمعرفة عدد الجرعات التي يتعين على طفلك تلقيها ليكون مواكبًا لأحدث التطعيمات المضادة لكوفيد-19.



العلامة التجارية للقاح		الأعمار	الجرعات للأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم	الأطفال الذين حصلوا على لقاح (لقاحات) كوفيد-19 السابق
لقاح Pfizer	من 6 أشهر إلى 4 سنوات		الجرعة الأولى: اللقاح المُعجل فترة 2025-2024.	تلقوا جرعة واحدة سابقًا: جرعة ثانية من اللقاح المُعجل فترة 2025-2024 بعد مرور فترة تتراوح بين 3 و8 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى. جرعة ثالثة بعد مرور 8 أسابيع على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المُعجل فترة 2025-2024.
			الجرعة الثانية: اللقاح المُعجل فترة 2025-2024، بعد مرور 8 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى. الجرعة الثالثة: اللقاح المُعجل فترة 2025-2024، بعد مرور 8 أسابيع على الأقل من تلقي الجرعة الثانية.	تلقوا جرعتين أو أكثر: جرعة واحدة من اللقاح المُعجل فترة 2025-2024 بعد مرور 8 أسابيع على الأقل من تلقي الجرعة الأخيرة.
لقاح Moderna	من 6 أشهر إلى 4 سنوات		الجرعة الأولى: اللقاح المُعجل فترة 2025-2024.	تلقوا جرعة واحدة سابقًا: جرعة أولى بعد مرور فترة تتراوح بين 4 و8 أسابيع من تلقي الجرعة الأخيرة من اللقاح المُعجل فترة 2025-2024.
			الجرعة الثانية: اللقاح المُعجل فترة 2024-2023، بعد مرور فترة تتراوح بين 4 و8 أسابيع من تلقي الجرعة الأولى.	تلقوا جرعتين أو أكثر: جرعة أولى بعد مرور فترة تتراوح بين 4 و8 أسابيع من تلقي الجرعة الأخيرة من اللقاح المُعجل فترة 2025-2024.
لقاح Novavax			لا يتوفر لقاح Novavax لأي شخص يبلغ من العمر أقل من 12 عامًا.	

نت تعانني من أعراض متوسطة أو شديدة في المناعة، فسوف تختلّف التوجيهات.

*يمكن للأشخاص الذين أصيبوا مؤخّرًا بمرض كوفيد-19 أن يزدادوا الحماية الفعّالة بين الإصابة بالعدوى وتلقي اللقاح يمكن أن يؤدي إلى تحسّن الاستجابة المناعية لتلقي اللقاح. كما لوحظ أيضًا انخفاض خطر الإصابة بالعدوى مرة أخرى في الأسابيع أو الأشهر التالية للإصابة. ينبغي كذلك أن يتم وضع العوامل الفردية، مثل خطر الإصابة **بالمرض الشديد** (باللغة الإنجليزية) **العدوى كوفيد-19**، أو **معدلات انتشار عدوى كوفيد-19**، (باللغة الإنجليزية)، أو الخصائص الصّالتي تميّز سلالة SARS-CoV-2 المنتشرة في الاعتبار، عند اتخاذ القرار بشأن تأجيل تلقي الجرعة بعد الإصابة بالعدوى.

Vaccinate WA